



GRANDES CULTURES

Envoi n° 29 du 22 octobre 1997

ISSN N° 0767 - 5542

N°ordre.071

Colza

STADES : 6 à 10 feuilles

piégeages élevés dans le sud Seine et Marne (Chateau landon et Bray sur Seine).

Captures au 20/10

| | |
|---------------------------|----|
| Maisoncelles en Brie (77) | 1 |
| Jouy le chatel (77) | 8 |
| Le Chatelet en Brie (77) | 3 |
| Bray / Seine (77) | 14 |
| St Germain / école (77) | 3 |
| Chateau landon (77) | 34 |
| Buchelay (78) | 0 |
| Brueil en Vexin (78) | 1 |
| Bullion (78) | 0 |
| Boinvilliers (78) | 0 |
| Mespuits (91) | 0 |
| Corbreuse (91) | 0 |
| Maisse (91) | 2 |

Ravageurs

ALTISES

Encore quelques captures sur certains postes.

PUCERONS VERTS

Les populations ont encore augmenté (voir tableau ci-dessous) la semaine dernière. Ils sont présents dans pratiquement toutes les parcelles y compris celles ayant fait l'objet d'un traitement (difficulté d'atteindre les pucerons qui sont localisés sur la face inférieure des feuilles les plus basses). Les niveaux d'attaque vont de 10-20% à 70-100% de pieds porteurs de 1 à 10 pucerons. Il est difficile d'apprécier le risque de transmission de virose, de ces infestations limitées en nombre de ravageurs, mais qui durent depuis parfois 4 semaines.

 Niveaux d'infestation moyens
sur 7 sites

| | |
|--------------|------|
| 25/9 au 1/10 | 20 % |
| 2 au 8/10 | 33 % |
| 9 au 15/10 | 37 % |
| 16 au 22/10 | 63 % |

LARVES DIVERSES

Les larves s'observent difficilement. Par contre, on voit quelques dégâts de morsures sur des feuilles. Rien de spectaculaire en général.

CHARANCON DU BOURGEON


Après quelques captures fin septembre sur des postes du sud de la région, le vol de charançon a véritablement démarré ce week end dans la plupart

des sites, avec des niveaux de

Une protection contre le charançon du bourgeon doit s'envisager 10 jours après les premières captures, soit en début de semaine prochaine.

Phoma

On note toujours l'absence de symptômes sur feuilles, et de projections de spores. Compte tenu du stade des colzas, les traitements fongicides ne sont pas justifiés.



Céréales

Ravageurs

Les pucerons (majorité d'ailés + quelques aptères) continuent de s'installer sur les plantes au stade 1 à 2 feuilles. Les niveaux d'attaque restent faibles (de 0 à 4% de pieds porteurs) mais par contre on en trouve dans presque toutes les parcelles.

Céréales :
Surveillez les pucerons.

Colza :
Vol important de charançon.

Les cicadelles sont encore très présentes dans les repousses, et on en piège aussi sur les levées, en moins grand nombre. Leur présence est signalée dans pratiquement toute la région.

Surveillez bien vos parcelles non traitées GAUCHO, surtout si la douceur persiste. Intervenez dès le seuil de 10% de pieds porteurs de pucerons ou si les pucerons séjournent plus de 10 jours.

Limaces

Les conditions d'humidité des sols sont favorables à ce ravageur. Il convient d'être vigilant.

(fin du message)